



Uloa coarctata (P.Beauv.) Hammar

Statut : **VU**

Morphologie

Mousse formant de petites touffes lâches, vert foncé à brunâtre, d'environ 1 cm de haut. Feuilles légèrement tordues et courbées (à l'état sec), plus ou moins longuement lancéolées, à l'apex aigu et aux marges réfléchies. Nervure étroite atteignant presque l'apex. Sporophyte émergé, formé d'une soie de 3-4 mm portant une capsule pyriforme brun pâle, avec des sillons très peu marqués autour de l'orifice contracté de l'urne. Exostome à 16 dents flexueuses et papilleuses, endostome très rudimentaire ou absent.

Reproduction


Espèce autoïque, dont les sporophytes sont fréquents.

Biogéographie

Espèce sub-océanique boréo-montagnarde.

Répartition en Auvergne


Le principal foyer pour cette espèce est située sur la Chaîne des Puys. D'autres foyers secondaires sont présents dans l'ouest cantalien et de façon plus dispersée en Haute-Loire ainsi que dans le Forez. Une unique localité dans l'Allier près de la bordure berrichonne.



Habitats

Espèce que l'on peut rencontrer du collinéen inférieur jusqu'au montagnard, au sein de différents types de boisements humides, en particulier dans les saulaies (para-tourbeuses à eutrophes), mais aussi dans les boulaies, aulnaies et parfois des fourrés arbustifs ou des chênaies. On l'observe sur le tronc ou les branches de nombreuses espèces de saules (*Salix caprea*, *S. acuminata*, *S. pentandra*, *S. atrocinerea*), de bouleaux, chênes, noisetier, peupliers, ...

Distribution altitudinale



Espèces compagnes

Les principales compagnes de cette espèce sont *Uloa crista*, *U. bruchii*, *Orthotrichum affine*, *O. lyellii*, *O. striatum*, *Frullania dilatata*, *Radula complanata*, *Metzgeria furcata* et *Hypnum cupressiforme*.